СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

08.04.2025

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата Палочки внутриматочные с ихтиолом

(Организация-разработчик: ООО НПП «Агрофарм»; Россия, 394061, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Труда, д.10, к 18)

Номер регистрационного удостоверения 15-3-12.12-3279№ПВР-3-1.9/00159

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата:

- торговое наименование лекарственного препарата: Палочки внутриматочные с ихтиолом (Bacilli intrauteri cum Ichthyolo).

- международное непатентованное наименование: ихтиол (ихтаммол).

2. Лекарственная форма: суппозитории для внутриматочного введения.

Палочки внутриматочные с ихтиолом в качестве действующего вещества в одном суппозитории массой 10 г содержат ихтиол (аммониевую соль сульфокислот сланцевого масла) – 1 г и вспомогательные вещества: полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400.

3. По внешнему виду препарат представляет собой палочки темно-бурого цвета, цилиндрической формы с заостренным концом.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства; после вскрытия упаковки – 1 месяц.

Запрещается применение Палочек внутриматочных с ихтиолом по истечении срока годности.

4. Палочки внутриматочные с ихтиолом выпускают расфасованными по 5 штук в двойные полиэтиленовые пакеты, запаянные термическим способом или закрытые защелкой «гриппер». Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.

5. Палочки внутриматочные с ихтиолом хранят в закрытой упаковке производителя в защищённом от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 до 20°С.

6. Палочки внутриматочные с ихтиолом следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускаются Палочки внутриматочные с ихтиолом без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Палочки внутриматочные с ихтиолом относятся к фармако-терапевтической группе: антисептики и дезинфицирующие средства.

10. Входящий в состав препарата ихтиол (аммониевая соль сульфокислот сланцевого масла) за счет содержащихся в нем ароматических соединений и органически связанной серы, оказывает антимикробное, противопаразитарное, противовоспалительное, кровоостанавливающее, местно-анестезирующее и кератопластическое действие.

При внутриматочном введении препарата ихтиол при контакте со слизистыми оболочками вызывает слабое раздражение чувствительных нервных окончаний, сменяющееся понижением их чувствительности, что приводит к возникновению рефлексов, изменяющих трофику тканей, улучшению обмена веществ, повышению сосудистого тонуса, восстановлению кровообращения. Полиэтиленоксидная основа препарата оказывает дегидратирующее действие.

Выводится ихтиол из организма животного преимущественно с вагинальным секретом.

Палочки внутриматочные с ихтиолом по степени воздействия на организм относятся к веществам «малоопасным» (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендованных дозах не оказывают сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

11. Палочки внутриматочные с ихтиолом применяют коровам, овцам и козам с целью профилактики воспалительных процессов в матке после родовспоможения, кесарева сечения, оперативного отделения последа и с целью лечения послеродовых эндометритов.

12. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к ихтиолу.

13. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Палочек внутриматочных с ихтиолом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Палочками внутриматочными с ихтиолом.

При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки, их необходимо промыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании

препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Палочки внутриматочные с ихтиолом не предназначены для применения беременным самкам. Ограничения по использованию препарата в период лактации отсутствуют.

15. Палочки внутриматочные с ихтиолом вводят в полость матки коровам в разовой дозе 3-5 палочек, овцам и козам – 1-2 палочки:

с профилактической целью (после родовспоможения, оперативного отделения последа) – однократно;

с лечебной целью – каждые 24 часа до клинического выздоровления животного, но не более 5 раз.

Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата. Суппозитории вводят в шейку матки рукой, одетой в полиэтиленовую перчатку разового использования, или с помощью корнцанга и проталкивают в полость матки

16. При применении Палочек внутриматочных с ихтиолом в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические средства.

17. Симптомы передозировки препарата у животных не выявлены.

18. Не следует применять Палочки внутриматочные с ихтиолом совместно с другими препаратами для внутриматочного введения. Информация о несовместимости препарата с лекарственными средствами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствует.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению его терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе, по той же схеме.

21. Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 2 суток после последнего применения Палочек внутриматочных с ихтиолом. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Использование молока в пищевых целях допускается не ранее чем через 2 суток после последнего введения препарата. Молоко, полученное ранее установленного срока, после термической обработки может быть использовано в корм животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	ООО НПП «Агрофарм, Россия, 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Витрука, д.1 А
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	ООО НПП «Агрофарм»; Россия, 394061, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Труда, д.10, к 18

Директор ООО НПП «Агрофарм» Г.Н. Близнецова